

女性与梅毒

梅毒是一种严重的感染，危害着越来越多的澳洲女性。您可以增加对梅毒的了解并且保护自己。



梅毒是一种性传染病（STI），通过性行为由一人传给另一人。



越来越多的15至44岁女性受其危害

从2016年到2022年，15至44岁澳洲女性的传染性梅毒发病率增加了158%*。



您可能身患梅毒而不知

有些人可能并无不适感，或不知道自己患有梅毒。您可能在不知情的状态下将梅毒传给自己的伴侣。

我们建议您与您的性伴侣定期做全面的性传染病检测 – 即便没有症状也应如此。

如果您得知自己有梅毒，请告知您的性伴侣，让他们也能去接受检测与治疗。这么做可以防止梅毒再次传给您或其他人。



梅毒的症状因人而异

如果您患上梅毒，初期迹象是生殖器、肛门与嘴上发出的疮或溃疡。

随着时间的推移，其他症状也可能出现：

- 皮疹
- 皮肤病变
- 淋巴结肿大
- 脱发
- 肌肉与关节疼痛
- 头痛
- 疲惫



如不予以治疗，梅毒可能导致：

- 脑部感染
- 痴呆症
- 肺与心脏衰竭
- 失明
- 死亡

*Australian Department of Health and Aged Care, (2023), National Notifiable Disease Surveillance System. Available at <https://nindss.health.gov.au/pbi-dashboard>

情况说明书

女性与梅毒



将梅毒传给您的宝宝可能是致命的

如果您在怀孕期间患有梅毒，就有可能在宝宝出生前把梅毒传播过去。

这叫做先天性梅毒，可能导致：

- 流产
- 死产
- 早产
- 婴儿出生体重低
- 婴儿出生后不久夭折

先天性梅毒可能对宝宝的大脑或器官造成永久性的伤害。这会影响他们的生长与发育。

有些宝宝的生长发育问题可能岁数大一点才显现，从而造成诊断的延误。



定期检测可以帮助您

我们推荐您定期接受全面的性传染病检测 - 没有症状也应如此，已怀孕或准备怀孕更应如此。

梅毒检测是怀孕期间的重要常规检测。

为防止先天性梅毒，您在怀孕期间要接受检测至少两次。这是因为社区梅毒病例有所增加。如果您的感染风险较高，可能还要多做一次检测。

请到医生、助产士或产科服务提供者处寻求全面的性传染病检测，这其中包括梅毒检测。



治疗很简单

治疗梅毒很简单。我们可以用药物（通常是注射剂）消除感染，对您与宝宝来说也是安全的。

您需要在接受治疗后验血，以确保治疗生效。

您的医生或性健康专家可以给您提供治疗并监测您的情况。



如何预防梅毒

预防梅毒的最好方法是采用安全性行为：

- 与新的性伴侣在一起时每次都要用安全套，以及可以与安全套一起使用的润滑液（例如水基或者硅基润滑液）。
- 如果有人生殖器、肛门或嘴上有疮或溃疡，避免与其发生性行为。
- 定期做性传染病检测，其中包括梅毒检测。
- 性伴侣也应定期接受检测（以及治疗），以防梅毒再次传给您或其他人。
- 如果您觉得自己联系性伴侣时会感到不自在，可以访问 www.letthemknow.org.au 网站寻求建议，也可以与家庭医生或医疗服务提供者谈论此事。



扫描QR二维码
获取关于梅毒与
妇女健康方面的
更多资讯。